




# Rotwild

| Ordnung                    | Unterordnung   | Familie                                      | Unterfamilie  | Art     |
|----------------------------|--|--|---------------|---------|
| Paarhufer                  | Wiederkäuer  | Geweihträger<br>oder Hirschartige (Cerviden) | Echte Hirsche | Rotwild |
| <b>Benennung</b>           | <p>Männlich: Hirsch<br/> Weiblich: Tier<br/> Jungtier: Kalb<br/> das männliche Junge im 1. Lebensjahr: Hirschkalb<br/> das männliche Junge im 2. Lebensjahr: Schmalspießer (1. Kopf)<br/> das männliche Junge im 3. Lebensjahr: Junghirsch (2. Kopf)<br/> das weibliche Junge im 1. Lebensjahr: Wildkalb (Tierkalb)<br/> das weibliche Junge im 2. Lebensjahr: Schmaltier, Schmalstück<br/> das weibliche Junge im 3. Lebensjahr, welches noch nicht an der Brunft teilgenommen hat:<br/> übergewandenes Schmaltier<br/> weibliche Stücke mit Kälbern: Kahlwild, Kahlwildrudel<br/> die Anführerin eines Rudels: Leittier<br/> ein Tier, das ein Kalb führt. Führendes Tier, Kälberstück<br/> ein Tier, das bereits ein Kalb gesetzt hat: Alttier, Stuck<br/> unfruchtbares weibliches Stück: Gelttier</p> |  |               |         |
| <b>Körperbau</b>           | <p>Höhe: Hirsch 1,10 – 1,40m Alttier 0,90 – 1,20m<br/> Länge: Hirsch 1,80 – 2,10m Alttier 1,60 – 1,80m<br/> Gewicht (aufgebrochen): Hirsch bis 160kg; Alttier 90kg</p>   |  |               |         |
| <b>Sinne</b>               | <p>Windet und vernimmt sehr gut = Geruchssinn und Gehör sehr gut,<br/> äugt gut, allerdings nur bewegte Objekte (Bewegungsseher)</p>   |  |               |         |
| <b>Lebensweise</b>         | <p>Rudeltier<br/> Kahlwildrudel (Mutterfamilie = Alttiere, Schmaltiere, Kälber, und manchmal auch Schmalspießer,<br/> geführt von einem Leittier)<br/> Feisthirschrudel (Hirschrudel im Sommer, diese lösen sich zur Brunft auf)<br/> Brunft rudel (Kahlwildrudel mit einem Platzhirsch in der Brunft)<br/> Tagaktiv - wenn keine Störung</p>  |  |               |         |
| <b>Nahrung</b>             | <p>Mischäser, wenig selektiv<br/> Gräser, Kräuter, Triebe und Knospen, Blätter, Nadeln, Rinde, Getreide, Kartoffeln, Rüben, Kastanien,<br/> Eicheln, Bucheckern, Pilze, Beeren, Wildobst</p>   |  |               |         |
| <b>Fortpflanzung</b>       | <p>Brunft: Mitte September bis Mitte Oktober (merke: Oktoberfest-Zeit)<br/> Tragzeit: 34 Wochen bzw. 8,5 Monate<br/> 1 Kalb, selten 2 Kälber<br/> Stillzeit: 6 Monate<br/> Ablegetyp: Kälber sind voll entwickelt, werden aber die ersten Wochen abgelegt<br/> Zuwachs: 75%</p>  |  |               |         |
| <b>Duftdrüsen</b>          | <p>Laufbürsten, Tränengrube, Wedeldrüse</p>  |  |               |         |
| <b>Gebiss</b>              | <p>Vollständig 34 Zähne nach 32 Monaten<br/> Nach dem 32. Lebensmonat ist der 3. Praemolar im Unterkiefer nicht mehr dreiteilig, sondern<br/> zweiteilig</p>   |  |               |         |
| <b>Geweih</b>              | <p>Die Stange entlang von unten nach oben:<br/> Rosenstock - Rose - Augspross - Eisspross - Mittelspross - (Wolfspross) - Krone oder Gabel<br/> Geweihbildung - Kolbenzeit ca. 140 Tage<br/> Erstlingsgeweih (Schmalspießer) hat keine Rosen<br/> Je älter der Hirsch ist, umso schneller wirft er ab und fegt früher.</p>   |  |               |         |
| <b>Haarwechsel</b>         | <p>Winterhaar im September/Oktober; Sommerhaar im Mai; Jüngere verfärben früher als Alte.</p>  |  |               |         |
| <b>Losung</b>              | <p>Kotbeeren mit „Näpfen und Zäpfchen“ lose miteinander verbunden</p>  |  |               |         |
| <b>Laute</b>               | <p>Röhren, Schrecken, Mahnen, Knören/Trenzen, Klagen</p>   |  |               |         |
| <b>Vorkommen in Bayern</b> | <p>Bayerischer Wald, Alpenraum, Rhön, Spessart, Fichtelgebirge</p>   |  |               |         |
| <b>Bejagung</b>            | <p>Ansitz, Pirsch, Drückjagd</p>   |  |               |         |

|              | Januar | Februar  | März | April | Mai        | Juni | Juli       | August | September        | Oktober    | November | Dezember |
|--------------|--------|----------|------|-------|------------|------|------------|--------|------------------|------------|----------|----------|
| Brunftzeit   |        |          |      |       |            |      |            |        |                  |            |          |          |
| Tragzeit     |        |          |      |       |            |      |            |        |                  |            |          |          |
| Setzeit      |        |          |      |       |            |      |            |        |                  |            |          |          |
| Säugezeit    |        |          |      |       |            |      |            |        |                  |            |          |          |
| Haarwechsel  |        |          |      |       |            |      | Sommerhaar |        |                  | Winterhaar |          |          |
| Geweihzyklus |        | Abwerfen |      |       | Kolbenzeit |      |            |        | verfestes Geweih |            |          |          |



**Rothirschgeweih**  
(ungerader Achtzehnder)



ziehend

flüchtend