

Gamswild

Ordnung	Unterordnung	Familie	Unterfamilie	Art
Paarhufer	Wiederkäuer	Hornträger (Boviden)	Ziegenartige	Gamswild
Benennung	Männlich: Bock, Gamsbock Weiblich: Geiß, Gamsgeiß das männliche Junge im 1. Lebensjahr: Bockkitz das männliche Junge im 2. Lebensjahr: Jahrling, Jährlingsbock das männliche Junge im 3. Lebensjahr: zweijähriger Bock das männliche Junge im 4. Lebensjahr: dreijähriger Bock das weibliche Junge im 1. Lebensjahr: Geißkitz das weibliche Junge im 2. Lebensjahr: Jahrling, Schmalgeiß, Jährlingsgeiß			
Körperbau	Höhe: 70 – 80 cm Länge: 90 – 130 cm Gewicht (aufgebrochen): 15 – 30 Kg			
Sinne	Windet und vernimmt sehr gut = Geruchssinn und Gehör sehr gut, äugt nur bewegte Objekte (Bewegungsseher)			
Lebensweise	Tagaktiv, lebt in Rudeln Scharwildrudel (auch Geraffel): Geißen, und Jungwild Mittelalte Böcke bilden lose Trupps, alte Böcke meist Einzelgänger Lebt vorwiegend in der Übergangszone der Waldgrenze und über der Waldgrenze, im Winter auch in den Wäldern			
Nahrung	Mischtyp im Sommer: Selektierer - frische Gräser, Kräuter, Blüten, Blätter, Knospen, Triebe, Früchte von Zwergsträuchern im Winter: Naturheu (Lahnergras), Flechten, Moose, Triebe, Knospen Nahrungsaufnahme vorwiegend in den frühen Morgen- und Abendstunden			
Fortpflanzung	Brunft Mitte November bis Mitte Dezember Lebhaftes Brunft, Verfolgungsjagden und Kämpfe zwischen den Böcken Tragzeit: 25-27 Wochen Meist 1 Kitz Stillzeit: bis November Nachfolgetyp: Kitz folgt der Mutter sofort – schließen sich nach 2 Wochen wieder dem Rudel an Geschlechtsreife erst im 3.-4. Lebensjahr Zuwachs: 40% - hohe Verluste bei den Kitzen im 1. Lebensjahr (Lebensraum)			
Duftdrüsen	Brunftfeigen hinter der Krucke			
Gebiss	Vollständig 32 Zähne nach 40-44 Monaten			
Horn - Krucke	Beide Geschlechter Wird nicht abgeworfen Größtes Wachstum in den ersten 4 Jahren Schläuche wachsen vom Stirnzapfen aus Böcke sind stärker gehackelt als Geißen und an der Basis rund (Geißen oval)			
Haarwechsel	Winterhaar im September; Sommerhaar im Mai			
Losung	bohnenförmig			
Laute	Pfeifen, Meckern (Kontaktlaut zwischen Geiß und Kitz), Blöcken, Blädern (Bock)			
Vorkommen	Bayerischer Alpenraum, Elbsandsteingebirge, Schwarzwald			
Bejagung	Ansitz, Pirsch, Riegeljagd			

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Brunftzeit												
Tragzeit												
Setzzeit												
Säugezeit												
Haarwechsel												